

UNITA' OPERATIVA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA

PREPARAZIONE PER RETTOSIGMOIDOSCOPIA

DIETA: Il giorno precedente l'esame evitare i seguenti alimenti:

verdure

legumi (piselli, lenticchie, etc...)

ortaggi e frutti con bucce o semi (uva, pomodori, fichi, etc...)

MATERIALE: n.2 clisteri tipo “ STIPSIGOL CLISM” da 120 ml

PREPARAZIONE:Praticare 1 clistere la sera che precede l'esame e 1 clistere circa due ore prima dell'esame endoscopico , stando a letto e trattenendo la soluzione per almeno 10 (dieci) minuti prima di evacuare. La mattina dell'esame digiuno.

Terventum Salus S.R.L.

Località Canneto snc, 86020 – Roccavivara (CB)

P.IVA/CF 01620760700 - CONTATTI: 0874/571701 – info@centrolarinascita.it

Direttore Sanitario : Dott. Domenico Di Baggio

RACCOMANDAZIONI PER PAZIENTI

SE LA PRESTAZIONE VIENE ESEGUITA A PAGAMENTO NON SERVONO LE IMPEGNATIVE

- Portare la documentazione sanitaria: precedenti esami endoscopiche, radiografie, esami di laboratorio etc...
- E' indispensabile essere accompagnati da una persona di fiducia in grado di guidare l'auto in quanto a causa della sedazione pre- endoscopica, il paziente non potrà condurre l'auto dopo l'esame.
- E' indispensabile **EVITARE** di portare con sé oggetti di valore presso gli ambulatori di Endoscopia.
- **In caso di mancato accompagnamento l'esame non potrà essere eseguito .**

NOTA BENE

(solo per pazienti che eseguono terapie con farmaci anticoagulanti)

- 5 Giorni prima dell'esame endoscopico , si consiglia la sospensione dell'antiaggregante piastrinico (Clopidogel, Plasugrel, Ticagrelor) o dell'anticoagulante (Coumadin o altra tipologia) e l'eventuale sostituzione cn eparina a basso peso molecolare **previa consultazione e benessere dello specialista che li ha prescritti (cardiologo, ematologo, chirurgo vascolare o altri).**
- L'eparina può essere eseguita fino alla sera precedente l'esecuzione dell'esame endoscopico.
- Non eseguire l'eparina la mattina dell'esame endoscopico.
- Il giorno prima dell'esame endoscopico , esclusivamente per i pazienti che assumono terapia anticoagulante (Coumadin) è necessario eseguire i seguenti esami ematochimici:
 - Emocromo
 - Assetto Emo coagulativo(PT, PTT,INR)**Portare i referti in visione.**
- L'antiaggregante o l'anticoagulante potranno essere assunti dopo l'esecuzione dell'esame endoscopico.

La mancata osservanza delle suddette indicazioni potrebbe non consentire l'esecuzione di biopsie e/o di manovre operative come, per esempio, la polipectomia.

Terventum Salus S.R.L.

Località Canneto snc, 86020 – Roccapivara (CB)

P.IVA/CF 01620760700 - CONTATTI: 0874/571701 – info@centrolarinascita.it

Direttore Sanitario : Dott. Domenico Di Baggio